

NUR WEIL EINE  
**NAHT**  
EINFACH BEGINNT,  
MUSS SIE NICHT  
EINFACH VERHEILEN.

GIBT ES  
MÖGLICHKEITEN,  
KOMPLIKATIONEN  
ZU VERHINDERN  
ODER ZU REDUZIEREN?

## PREVENA™ INCISION MANAGEMENT SYSTEM

### FÜR DAS MANAGEMENT VON INZISIONEN, BEI DENEN EIN POSTOPERATIVES KOMPLIKATIONSRISSIKO BESTEHT

#### DIE PREVENA™ THERAPIE KANN HELFEN:

- Wundränder zusammenzuhalten (dies kann die Wahrscheinlichkeit von Nahtdehissenzen verringern)<sup>1</sup>
- die Durchblutung zu fördern<sup>2</sup>
- Gewebespannung\* und Ödeme zu reduzieren
- die Operationswunde vor externer Kontamination zu schützen

\*Hinterlegte Daten

#### EINFACHE ANWENDUNG\*\*



1 Verband über sauberer, verschlossener Inzision anlegen



2 Verband mit Kanister verbinden, Kanister in das Gerät einsetzen



3 Einschalten  
Verband 2 bis 7 Tage auf der Naht belassen

\*\*Darstellung der grundlegenden Anwendung. Detaillierte Informationen zu Gebrauch und Anwendung des Produkts finden Sie im „Handbuch für den Anwender“ des Prevena™ Incision Management Systems.

		MENGE	TEILENUMMER
<b>BESTELL- INFORMATIONEN</b>	<b>Prevena™ Incision Management System</b> Als 1 System pro Patient verpackt.	5	PRE1005
	<b>Prevena™ Incision Dressing</b>	5	PRE1055



Die Klinikrichtlinien zur Infektionskontrolle und Vorgehensweise bei der Abfallentsorgung sind zu befolgen. Die jeweiligen Standards sollten auf den jeweiligen lokalen Umweltvorschriften basieren.

**WICHTIGER HINWEIS: Spezielle Indikationen, Warn- und Vorsichtshinweise sowie Sicherheitsinformationen sind für die KCI-Produkte und Therapien vorhanden. Vor jeder Anwendung einen Arzt hinzuziehen und die Produkthanweisungen lesen.**

#### Fällt Ihnen ein Patient ein, der heute von der Prevena™ Therapie profitieren könnte?

Literaturnachweise: 1. Stannard JP, et al. Use of negative pressure therapy on closed surgical incisions: a case series. *Ostomy Wound Manage.* 2009; 55:58–66. 2. Timmers MS, et al. The effects of varying degrees of pressure delivered by negative-pressure wound therapy on skin perfusion. *Ann Plast Surg.* 2005; 55:665-671.

**DEUTSCHLAND:**  
KCI Medizinprodukte GmbH  
Hägenauer Straße 47  
D-65203 Wiesbaden  
24h Hotline 0800 783 3524  
Fax 0800 329 3524  
www.kci-medical.com

**ÖSTERREICH:**  
KCI Austria GmbH  
Lemböckgasse 49/Stiege, A/4.OG  
A-1230 Wien  
24h Hotline +43 1 86 330  
Fax +43 1 86 3306  
www.kci-medical.com

**SCHWEIZ:**  
KCI Medical GmbH  
Ifangstrasse 91  
CH-8453 Rümlang-Zürich  
24h Hotline +41 0848 848 900  
Fax +41 0848 848 901  
Zentrale +41 43 455 3000  
Fax +41 43 455 3020  
www.kci-medical.com

NICHT FÜR DEN VERTRIEB IN DEN USA.  
© 2010 KCI Licensing, Inc. Alle Rechte vorbehalten.  
Prevena und KCI sind Marken von KCI Licensing, Inc.  
Prevena ist durch eines oder mehrere der folgenden Patente geschützt. US6951553, 6936037. Weitere Patente angemeldet. DSL# 10-0071.EMEA